

例1) 東南アジアに1年転勤する会社員

	当日	1週後	2週後	3週後	4週後		半年後	1年後	備考
★ A型肝炎	▼			(▼)	▼		▼		2回接種で1年有効。3回接種で5年有効。
★ B型肝炎	▼			(▼)	▼		▼		同上
★ 破傷風	▼			(▼)	▼			▼	2回接種で5年有効
狂犬病(輸入)	▼	▼		(▼)	▼				急ぐ時は3回目を3週後に接種可能
日本脳炎	▼			(▼)	▼			▼	2回目は1~4週後

※B型肝炎の2回目は4週後とされているが、急ぐときは3週後に接種することもあり
 ※破傷風ワクチンは30歳未満では1回の追加接種(booster)としている(11~12歳頃DTワクチンを接種していることを前提として)
 ※狂犬病(国産)は当日、4週後の2回接種(半年後に3回目)

例2) 東南アジアに7日間出張する会社員

	当日	1週後	2週後	3週後	4週後		半年後	1年後	備考
★ A型肝炎	▼			(▼)	▼		▼		2回目は2~4週後
B型肝炎	▼			(▼)	▼		▼		2回目は4週後
★ 破傷風	▼			(▼)	▼			▼	2回目は3~8週後
狂犬病(輸入)	▼	▼		(▼)	▼				急ぐ時は3回目を3週後に接種可能
日本脳炎	▼			(▼)	▼			▼	2回目は1~4週後

※B型肝炎の2回目は4週後とされているが、急ぐときは3週後に接種することもあり
 ※破傷風ワクチンは30歳未満では1回の追加接種(booster)としている(11~12歳頃DTワクチンを接種していることを前提として)

★ 印は強く推奨されるもの。

例3) 米国に留学する学生の1例(各大学の留学募集要項に基づくワクチンが必要)

	当日	1週間後	2週間後	3週間後	4週間後	5週間以降		
B型肝炎	▼				▼			2回接種が必要な不活化ワクチンを先に終わらせる
DT(ジフテリア、破傷風)	▼							
髄膜炎菌	▼							
MR(麻疹、風疹)						▼		不活化ワクチンから7日以上あけて

※母子手帳を参照

マラリア予防薬

マラロンを渡航前24 - 48時間前から毎日1錠服用。帰国後7日間服用継続。1錠1500円(税込)

高山病予防薬

ネパール、ペルーなどの高地に行く場合には予防薬(ダイアモックス)の内服が推奨される
 (高地に入る前日より1/2錠を朝夕内服し、4日間継続) 1錠300円(税込)